



ЗАГАД

ПРИКАЗ

11.05.2009 № 454

г. Минск

г. Минск

Об утверждении перечня  
медицинских показаний  
к назначению картриджной формы  
инсулинов для пациентов с  
сахарным диабетом

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005г. № 843, в целях улучшения оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень медицинских показаний к назначению картриджной формы инсулинов для пациентов с сахарным диабетом согласно приложению.

2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

составить списки лиц подведомственной территории согласно утвержденному перечню (п.1. настоящего приказа) и представить их в ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» в срок до 30.06.2009;

пересмотреть с учетом утвержденного перечня заявки для централизованной закупки инсулинов на 2010 год и представить их в Министерство здравоохранения в срок до 30.06.2009.

3. Начальнику управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Волжанкиной Г.В. совместно с главным внештатным эндокринологом Министерства здравоохранения Шепелькевич А.П. подготовить техническое задание на закупку инсулинов на 2010 год с учетом утвержденного перечня.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Часнойты Р.А.

Министр

В.И.Жарко

Приложение  
к приказу  
Министерства  
здравоохранения  
Республики Беларусь  
«11» 05. 2009 N 454

Перечень медицинских показаний к назначению картриджной формы  
инсулинов для пациентов с сахарным диабетом

1. Дети (до 18 лет).
2. Лица с сахарным диабетом, болеющие с детства.
3. Учащиеся средних и высших учебных заведений.
4. Беременные и лактирующие женщины.
5. Пациенты с наличием социальной слепоты (состояние при котором зрение с коррекцией составляет менее 0,08 на лучше видящий глаз).